

AVERTISSEMENTS

DLP 21-3-83122157
AGRICOLES

Poste 428

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES

ARBO. VITI. RHONE-ALPES

ABONNEMENT ANNUEL: 80 f

REGISSEUR RECETTES D.D.A. CCP LYON 9431-17A



Circonscription RHONE-ALPES

55, rue Mazenod 69426 LYON CEDEX 3

15 Mars 1983

N° de série continue 249

Bulletin n° 5

ARBRES FRUITIERS

TAVELURE DU POIRIER

En Vallée du Rhône, les variétés les plus précoces atteignent le stade de sensibilité C3. Les premières contaminations peuvent venir des chancres pustuleux constitués l'année précédente. La protection doit donc commencer dès maintenant selon l'arrivée à sensibilité des différentes variétés.

Le premier traitement sera réalisé de préférence à l'aide d'un fongicide cuprique à raison de 500 g de cuivre métal/hl, afin de contrôler également le pseudomonas syringae.



C3 Gonflement apparent

ANTHONOME DU POMMIER

Dans les vergers où des dégâts sont habituellement rencontrés en cours de printemps (boutons floraux déformés en "clous de girofle") un traitement doit être réalisé lorsque les arbres atteignent les stades B-C. Utiliser du Lindane (20 g m.a./hl).



B Début de gonflement



C Gonflement apparent

PUCERON VERT DU PECHER



D Puceron vert

Dans la Drôme et l'Ardèche les arbres atteignent le stade D. Un traitement est conseillé pour lutter contre le puceron vert lorsque ce stade est atteint.

Utiliser du Lindane à raison de 30 g m.a./hl. Choisir un Lindane en formulation huileuse (Lindex huileux) ou "col" (Gammacol) ou Lindane + huile blanche.

MONILIA SUR PECHER

Lorsque le stade D est atteint, un traitement peut être réalisé à l'aide de l'une des matières actives suivantes : Bénomyl, Carbendazime, Iprodione (ROVRAL et KIDAN), Triforine (DENARIN, SAPROL), Vinchlozoline (RONILAN).

MONILIA SUR PRUNIER ET SUR CERISIER

Dans les zones tardives effectuer au stade B un traitement à l'aide d'un produit cuprique (375 g Cu/hl).

Dans les zones précoces où ce stade est dépassé, utiliser l'un des produits conseillés sur pêcher.

P 445

BACTERIOSE DU CERISIER (Chancre bactérien)



B

Bourgeon gonflé.

Dans les secteurs où des dépérissements ont été observés à l'automne dernier (en particulier zone de BESSENAY - 69) il est vivement conseillé de compléter la protection effectuée à l'automne par 2 nouvelles applications de cuivre au printemps :

- la première au stade B qui correspond au gonflement des bourgeons (donc à effectuer actuellement) à l'aide d'un produit cuprique en apportant 500 g Cu/hl.

Sur les parcelles récemment traitées au cuivre contre le gnomonia il est évidemment inutile d'intervenir de nouveau.

- la seconde sera effectuée au stade D (boutons blancs) en apportant 150 g de Cu/hl. Nous vous rappelons que cette protection doit être réalisée par tous pour être réellement efficace. Protégez particulièrement les jeunes vergers dès l'année de plantation ainsi que les variétés sensibles (Napoléon, Marmotte, Reverchon, Van, Hedelphingen). Traitez par beau temps.

FRAISIER

Dès la reprise de végétation, un traitement contre la maladie des taches pourpres (taches circulaires rouges ou brunes plus claires au centre) peut être nécessaire dans les parcelles habituellement attaquées (zones humides en particulier et plantations âgées). Utiliser un fongicide à base de Manèbe ou de Mancozèbe (240 g/hl).

Si on repère leur présence, un traitement contre les pucerons à l'aide de Lindane peut également être nécessaire.

VIGNE

ACARIOSE

Les ceps attaqués présentent au printemps un rabougrissement de végétation. Les feuilles sont petites, frisées et duveteuses. Une application spécifique se justifie sur les parcelles attaquées de façon chronique.

Traitement - Il sera effectué le plus près possible de la reprise de végétation. Actuellement, entre le stade A et B les huiles jaunes (Dytrol 50, Seppic Vigne, Véraline 3 fluide, traitement d'hiver Umupro) à 2-3 l/hl seront utilisées. Plus tard, du stade B à C on leur substituera les Oléoparathions à 45 g de m.a./hl, mais avec une efficacité moindre. Il faut souligner une action secondaire intéressante des traitements précoces à base d'huile sur cochenille et érinose.

Pour une bonne réussite appliquez ce traitement avec une forte pression et en mouillant abondamment.

- REPONDEURS TELEPHONIQUES -

Nous vous rappelons que pour diffuser encore plus rapidement l'évolution de la situation phytosanitaire des cultures, le Service de la Protection des Végétaux a mis en place des répondeurs téléphoniques qui peuvent être appelés 24 H sur 24.

- Répondeur P.V. de LYON (7)860.17.74
- Répondeur P.V. de VALENCE (Ardèche - Drôme) (75)43.34.36
- Répondeur du réseau "Stop Tavelure" (75)42.58.96
(Zone fruitière de la Drôme et de l'Isère)
- Répondeur P.V. de CHAMBERY (Savoie - Hte Savoie) (79)85.07.09

En outre, notre Service communique un message aux répondeurs suivants :

- ST MARTIN D'HERES (Isère) Météorologie Nationale (76)42.64.01
- ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire) Météorologie Nationale (77)55.32.39
- AMBERIEU EN BUGEY (Ain) Météorologie Nationale (74)38.38.77
- ANNECY (Hte Savoie) SUAD (50)67.34.11